Pour plus d’informations sur les lignes directrices de l’ASH, de l’ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

Synthèse des recommandations

Ces lignes directrices reposent sur les revues systématiques initiales et actualisées des preuves menées sous la direction de l'Outcomes and Implementation Research Unit du University of Kansas Medical Center (KUMC). Le panel a respecté les bonnes pratiques d'élaboration de lignes directrices recommandées par l'Institute of Medicine et le Guidelines International Network (GIN)[1-3]. Il a utilisé l'approche GRADE pour évaluer la certitude des preuves et émettre des recommandations[4-10].

Test à la desmopressine et administration.

RECOMMANDATION 2A

Chez les patients pour qui la desmopressine est une option de traitement valide (essentiellement mW de type 1) et dont le taux de FW de base est < 0,30 UI/ml, le panel *suggère* de réaliser un test à la desmopressine et d'instaurer le traitement en fonction des résultats plutôt que de ne pas réaliser le test et de traiter par acide tranexamique ou concentré de facteur (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

RECOMMANDATION 2B

Chez ces patients, le panel *suggère de ne pas* traiter par desmopressine en l'absence de résultats à la suite d'un test à la desmopressine (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

Remarques :

- Cette recommandation ne s'applique pas aux patients pour qui la desmopressine n'est pas une option de traitement raisonnable (par exemple, ceux atteints de la mW de type 3). La desmopressine est contre-indiquée dans la mW de type 3 en raison d'un manque d'efficacité et dans la mW de type 2B en raison d'une liaison plaquettaire accrue suivie d'une thrombocytopénie.

- De nombreux patients atteints de la mW de type 2 ne réagissent pas à la desmopressine et nécessitent d'autres modes de traitement. Un test à la desmopressine peut néanmoins servir à confirmer le diagnostic et la desmopressine peut toutefois être utile dans certains cas de saignements légers pour les patients atteints de la mW de type 2.

- Les patients subissant une intervention chirurgicale majeure, y compris au niveau de sites où un saignement même de faible ampleur risque de léser un organe critique (par exemple, intervention au niveau du système nerveux central), ne doivent pas recevoir de desmopressine comme unique traitement.

- Il est optimal de confirmer la réponse à la desmopressine afin d'utiliser celle-ci pour des interventions thérapeutiques, mais comme cela peut ne pas toujours être facilement réalisable, l'on peut supposer que les patients adultes atteints de la mW de type 1 dont les taux de FW de base sont ≥ 0,30 UI/ml réagissent à la desmopressine. Bien que ces patients puissent recevoir de la desmopressine sans qu'un test soit obligatoirement pratiqué, il est raisonnable d'obtenir les taux de FW pour confirmer la réponse après l'administration. Les patients ayant une mW de type 1 et des taux de FW < 0,30 UI/ml peuvent ne pas répondre à la desmopressine, d'où la recommandation de passer un test.

- Cette recommandation ne porte pas sur le choix entre acide tranexamique et concentré de FW.

Pour plus d’informations sur les lignes directrices de l’ASH, de l’ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

Remarques :

-

Declarations de bonnes pratiques :

Lorsque cela est réalisable, le panel encourage le développement d'établissements multidisciplinaires où gynécologues et hématologues reçoivent conjointement les patientes afin de faciliter la prise en charge des saignements menstruels abondants pour les patientes présentant des troubles de la coagulation.

Les décisions concernant l'utilisation d'un système intra-utérin à libération de lévonorgestrel doivent être prises dans le contexte d'une décision partagée avec contributions multidisciplinaires (notamment, professionnels dans le domaine de la gynécologie et de l'hématologie et patientes).

Pour certaines patientes, il peut y avoir d'autres bénéfices à une hormonothérapie, tels que le traitement des douleurs menstruelles et la prise en charge des symptômes liés à l'endométriose et au syndrome des ovaires polykystiques.

La carence en fer et l'anémie résultant d'une carence en fer sont associées à des issues défavorables, y compris à une qualité de vie liée à la santé moindre. Les patientes ayant des saignements menstruels abondants doivent être régulièrement évaluées et leur carence en fer et/ou anémie doivent être traitées.

Les femmes ayant des troubles de la coagulation connus et des saignements menstruels abondants doivent faire l'objet d'une évaluation gynécologique standard recommandée pour les femmes ayant des saignements menstruels abondants dans la population générale afin d'écarter des pathologies pelviennes courantes telles que fibroïdes et polypes, en particulier chez celles ne répondant pas au traitement de première intention.

Il faut prévoir une prise en considération spéciale des effets indésirables du traitement pour celles qui sont à risque élevé d'hyperplasie/de tumeurs endométriales, notamment les femmes âgées de plus de 35 ans et celles présentant des ovaires polykystiques, un indice de masse corporelle élevé et des comorbidités telles que diabète et hypertension.

Obstétrique : anesthésie neuraxiale

RECOMMANDATION 7

- Le risque individuel doit être évalué en tenant compte du diagnostic et des antécédents de la patiente et, pour cette raison, le panel préconise une visite au troisième trimestre, où les

Valeurs et préférences

Les valeurs et préférences pour ces lignes directrices ont été examinées du point de vue du patient, avec la contribution de tous les membres du panel, y compris les représentants des patients. Le panel des lignes directrices a estimé que la mortalité, les saignements majeurs, les événements indésirables graves, la fonction articulaire, les événements thrombotiques, l'incapacité à réaliser une intervention chirurgicale, la nécessité d'une hospitalisation, la transfusion, des interventions chirurgicales ou des agents hémostatiques supplémentaires et les hémorragies post-partum précoces ou tardives étaient des éléments de considération essentiels à la prise de décision et a accordé une grande importance à ces critères et à la possibilité de les éviter lors de l'évaluation des interventions. Ces recommandations accordent une grande importance à l'accès au traitement.

Explications et autres aspects pris en considération

Ces recommandations tiennent compte du coût et du rapport coût-efficacité, des ressources nécessaires, des répercussions sur l'équité en santé, de l'acceptabilité et de la faisabilité.

Introduction

Finalité de ces lignes directrices et objectifs spécifiques

Le but de ces lignes directrices est de fournir des recommandations fondées sur les preuves concernant la prise en charge de la mW. Ces lignes directrices ont pour finalité première de passer en revue, d'évaluer de manière critique et de mettre en application des recommandations fondées sur les preuves qui amélioreront l'accès à des traitements appropriés et faciliteront un traitement individualisé lorsque celui-ci est approprié. Grâce à une meilleure éducation des professionnels et des patients sur les données probantes et les recommandations fondées sur les preuves à disposition, ces lignes directrices visent à apporter une aide à la décision clinique pour une prise de décision partagée qui se soldera par un accès plus vaste à des soins de qualité pour les patients atteints de la mW.

Le public ciblé regroupe les patients, les hématologues, les médecins généralistes, les internistes, les obstétriciens, les gynécologues, les chirurgiens, les anesthésistes, les experts en médecine maternofœtale, les cliniciens autres et les décisionnaires. Les responsables politiques susceptibles d'être intéressés par ces lignes directrices sont notamment ceux qui participent à l'élaboration de plans locaux, nationaux ou internationaux dans le but de mettre en œuvre des protocoles de gestion des soins efficaces et d'améliorer les résultats pour les patients atteints de la mW. Ce document peut également servir de base à adapter par des panels locaux, régionaux ou nationaux élaborant des lignes directrices.

Description du problème de santé

La maladie de Willebrand est le plus fréquent des troubles de la coagulation héréditaires et a initialement été décrite par Erik von Willebrand en 1926[13]. Les estimations actuelles les plus fiables obtenues des soins primaires suggèrent que la mW affecte 1 personne sur 1 000[14]. Malgré cela, de nombreux praticiens ne savent toujours pas comment diagnostiquer ou traiter les patients atteints. Le FW joue un rôle clé dans la coagulation, car il sert de protéine porteuse pour le facteur VIII[15] et facilite la liaison plaquettaire au collagène exposé au niveau des sites lésés[16]. La mW survient en cas d'anomalies quantitatives ou qualitatives au niveau du FW. Les difficultés de diagnostic sont aggravées par l'existence de trois sous-types majeurs de la mW (tableau 1)[17].

Tableau 1

Classification de la mW : principaux types et sous-types

Type	Caractéristique
1	Diminution quantitative du FW avec ratios préservés entre VWF/Ag, VWF/Act et FVIII; distribution des multimères normale
	Diminution quantitative du FW avec ratios préservés entre VWF/Ag, VWF/Act et FVIII; VWF/pp accru par rapport au VWF/Ag
	Diminution de l'activité de la fonction plaquettaire du FW avec perte des multimères de haut poids moléculaire
	Diminution de l'activité de la fonction plaquettaire du FW avec structure multimérique préservée
	Liaison moindre du FVIII
	Augmentation de la liaison à la GPIb, entraînant souvent une thrombocytopénie
	Absence ou quasi-absence du FW
	Anomalie fonctionnelle de la GPIb, entraînant une liaison excessive des plaquettes et du FW et ultérieurement une thrombocytopénie et une perte des multimères de haut poids moléculaire
	BTm[(T)BT10 0 0 u qualque préservéeplaquDC BTp.10 0 0 10

Les principaux symptômes de la mW sont les hémorragies muco-cutanées telles qu'épistaxis, tendance aux ecchymoses, saignements prolongés à la suite de petites coupures et saignements menstruels abondants, ainsi que les saignements chirurgicaux, en particulier en cas d'extractions dentaires. Les patients atteints de la mW de type 3 peuvent présenter des saignements articulaires semblables à ceux observés dans l'hémophilie[21]. Les saignements menstruels abondants sont particulièrement préoccupants chez la femme en raison de leur fréquence, ce qui a des répercussions sur la qualité de vie et l'état de santé général[22,23]. De nombreuses femmes souffrent de carence en fer et d'anémie en conséquence de saignements menstruels abondants non reconnus ou traités de manière inadéquate[24]. Les complications résultant des HPP sont aussi plus fréquentes chez les femmes atteintes de la mW[25,26]. Un traitement approprié est un défi majeur pour ces patientes.

Les lignes directrices existantes sont axées sur les avis des experts, peu de place étant laissée aux préférences des patients ou à l'examen critique des preuves en vue de recommandations spécifiques, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les patients et leur famille, des traitements inefficaces ou l'absence de prise en considération des traitements efficaces.

Les sujets de préoccupation aussi bien des patients que des professionnels ont orienté le périmètre de ces lignes directrices et incluent les options thérapeutiques pour les femmes atteintes de la mW, les

L’appendice 2 fournit les formulaires complets de divulgation des intérêts de tous les membres du panel. Ont été divulgués dans la partie A des formulaires les intérêts financiers directs au cours des deux ans précédant la nomination; dans la partie B, les intérêts financiers indirects; et dans la partie C, les intérêts non essentiellement financiers. La partie D décrit les nouveaux intérêts divulgués par les membres après leur nomination. La partie E résume les décisions de l’ASH concernant les intérêts jugés conflictuels et la façon dont ils ont été gérés, y compris par récusation.

L’appendice 3 fournit les formulaires complets de divulgation des intérêts des chercheurs ayant contribué à ces lignes directrices.

Formulation des questions cliniques spécifiques et détermination des résultats d’intérêt

Le panel a organisé des séances de remue-méninges en ligne sur les questions des recommandations et une réunion en personne pour élaborer les questions décrites dans le tableau 2.

Tableau 2.

Synthèse des questions prioritaires

4.	Patients atteints de la mW subissant une intervention chirurgicale majeure	Maintien du taux de FVIII ≥ 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours après l'intervention chirurgicale	Maintien du taux d'activité du FW ≥ 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours après l'intervention chirurgicale	Mortalité, saignements majeurs, nécessité d'interventions chirurgicales supplémentaires, transfusion, événements indésirables graves, hospitalisation, événements thrombotiques
5.	Patients atteints de la mW subissant une intervention chirurgicale ou une procédure invasive mineure	Augmentation du taux d'activité du FW à ≥ 0,50 UI/ml à l'aide de concentré de FW ou de desmopressine	Acide tranexamique en monothérapie Traitement en association en augmentant le taux d'activité du FW à ≥ 0,50 UI/ml avec recours au concentré de FW ou à la desmopressine conjointement avec l'acide tranexamique	Saignements majeurs, nécessité d'agents hémostatiques supplémentaires, nécessité d'interventions chirurgicales supplémentaires, événements indésirables graves, mortalité, hospitalisation, transfusion, intervention chirurgicale impossible
6.	Femmes atteintes de la mW avec saignements menstruels abondants	Acide tranexamique	Hormonothérapie (notamment, système intra-utérin à libération de lévonorgestrel ou contraceptifs hormonaux) Desmopressine	Perte de sang menstruel et durée, absentéisme aux activités obligatoires, diminution de la qualité de vie liée à la santé, nécessité de traitements supplémentaires, nécessité d'une intervention chirurgicale ou d'une transfusion sanguine

7.	Femmes atteintes de la mW qui exigent ou souhaitent une anesthésie neuraxiale durant le travail			

Pour plus d'informations sur les lignes directrices de l'ASH, de l'ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

caractère direct des preuves; risque de biais de publication; présence d'effets importants; relation dose-réponse; et évaluation de l'effet de facteurs confondants opposés résiduels. La certitude était classée en quatre niveaux : très faible ( ), faible ( ), modérée ( ) et élevée ( )[6-8].

Au cours d'une réunion en personne de deux jours, le panel a élaboré des recommandations cliniques fondées sur les preuves résumées dans les tableaux EtD. Pour chaque recommandation, le point de vue adopté par le panel est celui de la population et un consensus s'est dégagé sur les points suivants : certitude des preuves, équilibre des bénéfices et des effets néfastes des options de prise en charge comparées, ainsi que suppositions concernant les valeurs et les préférences associées à la décision. Le panel des lignes directrices a également explicitement pris en compte l'étendue de l'utilisation des ressources associée aux autres options de prise en charge. Il s'est mis d'accord sur les recommandations (y compris leur orientation et leur force), les remarques et les qualifications par consensus ou, dans quelques rares cas, par vote (une majorité de 80 % était requise pour une recommandation forte) sur la base de l'équilibre de toutes les conséquences souhaitables et indésirables. Les lignes directrices finales, recommandations comprises, ont été examinées et approuvées par tous les membres du panel.

Interprétation des recommandations fortes et conditionnelles

Les recommandations sont qualifiées de « fortes » ou de « conditionnelles » selon l'approche GRADE. Les termes « le panel *recommande* » sont utilisés pour les recommandations fortes, et « le panel *suggère* » pour les recommandations conditionnelles. Le tableau 3 fournit l'interprétation des recommandations fortes et conditionnelles selon l'approche GRADE pour les patients, les cliniciens, les responsables de l'élaboration des politiques en matière de soins de santé et les chercheurs.

Tableau 3

Interprétation des recommandations fortes et conditionnelles

Implications		

Pour les responsables politiques	La recommandation peut être adoptée sous forme de politique dans la plupart des situations. Le respect de cette recommandation, conformément à la ligne directrice, peut être utilisé comme un critère de qualité ou un indicateur de performance.	L'élaboration de politiques devra faire l'objet d'un débat approfondi et impliquer les différentes parties prenantes. Les mesures de performance de la conduite à tenir suggérée doivent se concentrer sur la présence d'un processus décisionnel dûment documenté.
Pour les chercheurs	La recommandation est étayée par des recherches crédibles ou d'autres jugements convaincants qui rendent peu probable l'altération de la recommandation par des recherches supplémentaires. Parfois, une recommandation forte repose sur une des preuves de certitude faible ou très faible. Dans de tels cas, des recherches plus poussées peuvent fournir des informations importantes qui modifient la recommandation.	La recommandation devrait être renforcée (en vue de mises à jour ou d'adaptations futures) par des recherches supplémentaires. Une évaluation des conditions et des critères (ainsi que des jugements connexes, des preuves issues de la recherche et des aspects supplémentaires pris en considération) ayant déterminé la recommandation conditionnelle (plutôt que forte) aidera à cerner les lacunes possibles en matière de recherche.

Examen du document

Les recommandations préliminaires ont été passées en revue par tous les membres du panel, révisées, puis mises en ligne le 6 avril 2020 pour examen externe par les acteurs, y compris les organisations partenaires, les professionnels de santé autres, les patients et le grand public. Quarante-neuf personnes ont soumis des commentaires. Le document a été révisé pour tenir compte des commentaires pertinents, mais aucune modification n'a été apportée aux recommandations. Le sous-comité de supervision

institutionnelles, les contraintes de temps et la disponibilité des traitements. Ces lignes directrices peuvent ne pas inclure toutes les méthodes de soins appropriées pour les scénarios cliniques décrits. À mesure que la science progresse et que de nouvelles données probantes sont disponibles, les recommandations peuvent devenir obsolètes. Le respect de ces lignes directrices ne peut pas être la garantie de résultats fructueux. L'ASH, l'ISTH, la NHF et la FMH ne garantissent aucun des produits décrits dans ces lignes directrices.

Les déclarations concernant les valeurs et les préférences sous-jacentes ainsi que les remarques qui accompagnent chaque recommandation en font partie intégrante et servent à favoriser la justesse de leur interprétation. Elles ne doivent jamais être omises lors de la citation ou de la traduction des recommandations de ces lignes directrices. La mise en application des lignes directrices sera facilitée par les aides à la décision interactives à venir. Les liens vers les cadres EtD et les tableaux interactifs de synthèse des conclusions qui se trouvent dans chaque section devraient aussi simplifier l'utilisation de ces lignes directrices.

Recommandations

Prophylaxie

Dans la mW avec antécédents de saignements sévères et fréquents, faudrait-il utiliser la prophylaxie de routine avec le concentré de FW ou n'utiliser aucune prophylaxie de routine (à savoir, traitement ponctuel)?

RECOMMANDATION 1

Chez les patients atteints de la mW ayant des antécédents de saignements sévères et fréquents, le panel de lignes directrices *suggère* le recours à une prophylaxie à long terme plutôt que l'absence de prophylaxie (recommandation conditionnelle reposant sur une faible certitude des preuves des effets).

Remarque :

- Les symptômes hémorragiques et la nécessité d'une prophylaxie doivent être régulièrement évalués.

Synthèse des preuves.

Nous avons identifié trois corpus de preuves concernant la prophylaxie dans la mW : un essai randomisé comparant prophylaxie et placebo[34], cinq études avant-après avec comparaison explicite entre périodes prophylactiques et absence de prophylaxie, dont il est fait état dans neuf publications[35-43], et huit études avant-après avec comparaison implicite entre périodes prophylactiques et absence de prophylaxie, dont il est fait mention dans onze publications[36,38,43-51]. L'effet de la prophylaxie a été évalué pour les critères suivants : saignements spontanés (nombre d'événements par patient), épisodes hémorragiques (événements par mois et par patient), temps écoulé jusqu'au premier saignement en jours, épisodes hémorragiques durant plus de deux jours, événements indésirables graves, épisodes d'épistaxis, hémorragies gastro-intestinales et hémarthrose. Aux fins de cette question, un saignement majeur a été défini comme un saignement nécessitant une hospitalisation, une intervention chirurgicale ou une transfusion sanguine (d'au moins deux unités), résultant en une chute de l'hémoglobine ≥ 2 g/dl ou (événements [illegible] intra-rachidienne, intraoculaire, rétropéritonéale, intra-articulaire, péricardique ou intramusculaire avec syndro2315.81rn74 245.83 Tm[s suivantun

Autres critères EtD et aspects à prendre en considération.

Dans une enquête menée auprès du panel, tous les membres ont suggéré que les patients étaient susceptibles d'accorder une grande importance à la réduction du risque de saignement et que les conséquences des saignements sur la qualité de vie pouvaient jouer un rôle dans la prise de décision. La fréquence et la gravité des événements hémorragiques, l'âge du patient et le concours des membres de la famille et des autres aidants influenceront la prise de décision de chaque patient. Il est plus probable que les patients présentant un taux de saignements plus élevé accordent plus de valeur à la prévention des épisodes hémorragiques qu'à l'évitement d'événements indésirables, tandis que les patients sans

Tableau 4

Administration de concentré de FW

Option de concentré de FW	Description
Concentré de FW/FVIII (dérivé du plasma)	Concentré dérivé du plasma contenant à la fois du FW et du FVIII; administré par voie IV; dosage typique : de 40 à 80 unités d'activité VWF/RCo par kg
Concentré de FW (dérivé du plasma)	Concentré dérivé du plasma contenant seulement du FW; administré par voie IV; dosage typique : de 40 à 80 unités d'activité VWF/RCo par kg; s'il est utilisé pour un traitement en urgence, peut nécessiter l'ajout de concentré de FVIII chez les patients dont le FVIII de base est faible
Concentré de FW (recombinant)	Concentré recombinant contenant seulement du FW; administré par voie IV; dosage typique : de 40 à 80 unités d'activité VWF/RCo par kg; s'il est utilisé pour un traitement en urgence, peut nécessiter l'ajout de concentré de FVIII chez les patients dont le FVIII de base est faible

RCo, cofacteur de la ristocétine.

Le panel a identifié les besoins en recherche complémentaires suivants : 1) vastes essais contrôlés randomisés sur le recours à la prophylaxie *versus* un traitement ponctuel, en particulier chez les patients présentant des saignements muqueux; 2) études sur le recours à la prophylaxie pour les saignements menstruels abondants; 3) études sur le recours à la prophylaxie dans les saignements gastro-intestinaux; 4) études sur l'impact de la prophylaxie sur la qualité de vie; 5) études sur l'utilisation de concentré de FW dérivé du plasma *versus* recombinant pour la prophylaxie; 6) rôle d'un traitement anti-fibrinolytique concomitant avec la prophylaxie pour les saignements muqueux (par exemple, épistaxis, saignements menstruels abondants et saignements gastro-intestinaux); et 7) rôle des thérapies anti-angiogènes concomitantes avec la prophylaxie pour les saignements gastro-intestinaux.

Test à la desmopressine et administration

Dans la mW, les professionnels de santé doivent-ils réaliser un test à la desmopressine et choisir un traitement des saignements en fonction des résultats de ce test, ne pas réaliser le test à la desmopressine et traiter par concentré de FW et/ou acide tranexamique, ou ne pas réaliser le test à la desmopressine et traiter par desmopressine de manière empirique?

RECOMMANDATION 2A

Chez les patients pour qui la desmopressine est une option de traitement valide (essentiellement mW de type 1) et dont le taux de FW de base est < 0,30 UI/ml, le panel *suggère* de réaliser un test à la desmopressine et d'instaurer le traitement en fonction des résultats plutôt que de ne pas réaliser le test et de traiter par acide tranexamique ou concentré de facteur (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

RECOMMANDATION 2B

Chez ces patients, le panel *suggère de ne pas* traiter par desmopressine en l'absence de résultats à la suite d'un test à la desmopressine (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

Remarques :

- Cette recommandation ne s'applique pas aux patients pour qui la desmopressine n'est

En ce qui concerne la stratégie de traitement prophylactique chirurgical empirique par desmopressine en l'absence de résultats à la suite d'un test à la desmopressine, une étude a rapporté que l'hémostase était excellente chez 93 % des patients atteints de la mW de type 1 mineure et 73 % des patients atteints de la mW de type 1 modérée, avec une durée moyenne d'hospitalisation de 6,3 jours[76]. L'efficacité de cette stratégie, lorsqu'elle était utilisée pour gérer les épisodes hémorragiques aigus, a été jugée comme excellente dans 83 % des 254 épisodes hémorragiques chez les patients atteints de la mW de type 1 mineure et bonne dans 14 % des épisodes[77]. Pour la mW de type 1 modérée, l'efficacité a été jugée excellente dans 71 % des 254 épisodes hémorragiques et bonne dans 18 % des épisodes. La mW mineure ou modérée a été définie dans l'étude d'après les évaluations des cliniciens fondées sur une combinaison des valeurs de laboratoire et du phénotype hémorragique; toutefois, aucun seuil strict n'a été signalé. En termes d'efficacité de la prise en charge des saignements menstruels abondants, une étude a rapporté que 77 % des 22 patientes ont répondu au traitement, comme mesuré par un score PBAC (*Pictorial Blood Loss Assessment Chart*) < 100. Une autre étude a rapporté une efficacité chez 92 % des patientes ayant des saignements menstruels abondants pour une dose unique (excellente efficacité) ou deux doses (bonne efficacité) de desmopressine[77].

Dans l'ensemble, la certitude de ces effets estimés est très faible en raison du risque de biais dans les études (aucune ne comprenait de groupe témoin pour établir des inférences), de l'absence de comparaison directe et de l'imprécision des estimations (profil de preuve fourni dans l'appendice 5).

Effets néfastes et contraintes.

Avec une stratégie consistant à effectuer un test à la desmopressine et à utiliser les résultats pour déterminer le traitement prophylactique chirurgical, la proportion d'événements chirurgicaux pour lesquels les patients ont constaté un saignement postopératoire était de 6 % (IC à 95 %, 0,02 à 0,14) pour 199 événements chirurgicaux[61,62,64,67]. Une étude a rapporté que 10 des 41 patients ont eu des vomissements, cinq ayant dû être hospitalisés, et qu'un patient a développé une hyponatrémie[67]. Dans une autre étude qui portait sur 37 enfants, tous ont développé un certain degré d'hyponatrémie, généralement légère, mais deux ont présenté une hyponatrémie sévère et un de ces patients a eu des convulsions[62].

Avec une stratégie consistant à se priver d'un test à la desmopressine et à mettre en place un traitement prophylactique chirurgical empirique à base de concentré de FW ou d'acide tranexamique, le risque poolé d'épisodes hémorragiques était de 9 % sur 247 procédures (IC à 95 %, 2 à 34 %)[70,71-73]. Des événements indésirables liés au traitement ont été rapportés dans 2 % des 205 procédures chirurgicales (IC à 95 %, 0 à 31 %); aucun n'a été jugé grave[38,45,69,70]. Le besoin en transfusion était de 11 % sur 55 interventions chirurgicales (IC à 95 %, 5 à 22 %)[45,70]. Chez les patients recevant de l'acide tranexamique, des maux de tête (60 %), des douleurs dorsales (30 %) et des douleurs musculosquelettiques (40 %) ont été rapportés. Un saignement post-partum excessif s'est produit dans 1 (6 %) des 17 accouchements.

Pour la stratégie consistant à renoncer à un test à la desmopressine et à mettre en place un traitement prophylactique chirurgical empirique à base de desmopressine, une hyponatrémie a été notée chez 4 à 72 % des patients, bien que la définition de l'hyponatrémie ait varié entre les trois études[75,78,79]. Le traitement empirique par desmopressine a entraîné des maux de tête (9 %), des bouffées vasomotrices (9 %) ou les deux (4,5 %). Lorsque la desmopressine était utilisée pour la prophylaxie chirurgicale ou le traitement des hémorragies aiguës, des événements indésirables légers à modérés, tels que maux de tête, bouffées vasomotrices, nausées, étourdissements, asthénie, vomissements et œdème périphérique, ont été rapportés chez 43 % des patients atteints de la mW de type 1 mineure et 14 % de ceux atteints de la mW de type 1 modérée[77].

Il y a très peu de certitude dans l'estimation du risque d'effets indésirables en raison du manque d'études comparatives, de l'absence d'uniformité des résultats et de la petite taille des échantillons. Le panel des lignes directrices a jugé que les effets indésirables d'un test à la desmopressine avec traitement reposant sur les résultats ou de l'absence de test à la desmopressine et d'un traitement par concentré de FW ou acide tranexamique sont peu nombreux mais néanmoins importants. Il a jugé qu'en comparaison, les effets indésirables de l'utilisation empirique de la desmopressine sans test préalable pour confirmer la réponse étaient modérés. Le panel des lignes directrices était tout particulièrement préoccupé par l'attente éventuelle d'un effet thérapeutique alors que la réponse réelle à ce traitement est inconnue, ainsi

Tableau 5

Pour plus d'informations sur les lignes directrices de l'ASH, de l'ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

Le panel a identifié les priorités de recherche suivantes : 1) études sur l'utilisation de la prophylaxie chez les patients atteints de la mW recevant des agents antiplaquettaires ou anticoagulants; 2) études sur l'incidence des maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de la mW; et 3) dans le cadre de

Bénéfices, effets néfastes et contraintes.

En raison de l'hétérogénéité des rapports, nous n'avons pas pu effectuer de méta-analyses. Une série faisait état d'un taux moyen d'activité du FVIII de 1,344 UI/ml et d'un taux moyen d'activité du FW de 0,924 UI/ml, pour lesquels l'efficacité hémostatique était excellente dans 92 % des cas, bonne dans 4 % des cas et mauvaise dans 4 % des cas[46]. Il n'y a pas eu de complications hémorragiques, d'événements indésirables liés au traitement ou d'événements thrombotiques postopératoires. Une autre série faisait

Conclusions et besoins en recherche pour ces recommandations.

Le panel des lignes directrices a déterminé une très faible certitude des preuves d'un effet néfaste net pour la santé du seul maintien de l'activité du FVIII à ≥ 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours après une intervention chirurgicale majeure et suggère de maintenir les taux d'activité à la fois du FVIII et du FW à ≥ 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours après une intervention chirurgicale majeure. Même si la mise en œuvre du maintien uniquement du FVIII à ≥ 0,50 UI/ml semble plus réalisable, il est peu probable que les cliniciens choisissent seulement une des options en raison des multiples écueils existants en matière de faisabilité et d'acceptabilité. Bien que le maintien du seul taux de FVIII à > 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours post-intervention puisse être plus simple sur le plan logistique, en particulier dans les centres où les délais d'exécution du dosage du taux d'activité du FW sont longs ou l'accès au concentré de FW est limité par rapport aux préparations de FVIII, la seule administration du concentré de FVIII n'entraînera pas une augmentation suffisante du FVIII (puisque le FW sert de protéine de transport du FVIII) et ne résoudra pas le défaut sous-jacent du FW. Le maintien des taux d'activité du FW à ≥ 0,50 UI/ml permet au FW de contribuer à de multiples rôles physiologiques dans l'hémostase et, dans la plupart des cas, maintiendra simultanément les taux d'activité du FVIII à ≥ 0,50 UI/ml pendant la période périopératoire critique. Les patients présentant des sous-types spécifiques de la mW, tels que les types 2 et 3, peuvent ne pas atteindre une hémostase adéquate si seuls les taux de FVIII sont maintenus après l'intervention chirurgicale. Par conséquent, le panel suggère de maintenir à la fois le taux d'activité du FW et le taux d'activité du FVIII à ≥ 0,50 UI/ml pendant au moins trois jours chez les patients subissant une intervention chirurgicale majeure. Il est également à noter que des mesures locales peuvent être utiles durant l'intervention, y compris l'utilisation de tampons de gélatine ou de colle à base de fibrine et/ou l'application locale d'acide tranexamique[90]. Certains établissements ont une capacité limitée en matière de tests, la surveillance en temps réel du FVIII ou du FW n'étant pas disponible. Dans de tels .9 5a351e en manlrt

RECOMMANDATION 5B

Le panel *suggère* d'administrer de l'acide tranexamique seul plutôt que d'augmenter les taux d'activité du FW à ≥ 0,50 UI/ml lors de toute intervention chez les patients atteints de la mW de type 1 ayant des taux d'activité du FW de base > 0,30 UI/ml et un phénotype hémorragique léger et subissant des procédures mineures sur les muqueuses (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

Remarques :

- Les schémas thérapeutiques individualisés doivent prendre en considération la variation du risque hémorragique pour la procédure en question. Ils sont notamment importants pour les patients susceptibles d'avoir été surtraités lorsque l'activité du FW est augmentée à ≥ 0,50 UI/ml par un traitement quelconque et l'ajout d'acide tranexamique (par exemple, ceux subissant des procédures cutanées telles qu'une biopsie cutanée superficielle).

- Les patients atteints de la mW de type 3 auront besoin de concentré de FW pour parvenir à une éventuelle hausse significative des taux d'activité du FW. Le recours à la desmopressine est contre-indiqué dans cette population en raison d'un manque d'efficacité.

- De nombreux patients atteints de la mW de type 2 (type 2B compris) nécessiteront aussi un traitement par concentré de FW plutôt que par desmopressine.

- Pour les patients à risque élevé de thrombose, il peut être souhaitable d'éviter l'association d'une hausse prolongée des taux de FW et de FVIII (> 1,50 UI/ml) et d'un recours prolongé à l'acide tranexamique.

- Les chirurgse e.34tr−>stpatieut preenvis0.8 (aux gl'avoir −ours à la t)-mess cut51morrast0.7 (amique

Bénéfices, effets néfastes et contraintes.

L'utilisation de concentré de facteur seul ou de desmopressine seule pour augmenter les taux de FW à ≥ 0,50 UI/ml a été associée à un risque significativement plus élevé de saignements postopératoires (n = 59; RR, 6,29; IC à 95 %, 2,12 à 18,65) par rapport au traitement en association consistant en de l'acide tranexamique avec l'un ou l'autre de ces traitements[92,93]. Il n'était pas possible d'estimer l'effet relatif des saignements majeurs et les effets indésirables liés au traitement. La perte sanguine opératoire moyenne était de 84,1 ml (intervalle, 4 à 323 ml) chez ceux ayant une augmentation de l'activité du FVIII ≥ 0,50 UI/ml (n = 14) et de 61,2 ml (intervalle, 1 à 749 ml) chez ceux ayant une augmentation de l'activité du FVIII ≥ 0,50 UI/ml conjointement avec l'acide tranexamique (n = 14; *P* = 0,02).

L'évaluation de la stratégie d'augmentation des taux de FW à au moins 0,50 UI/ml par un traitement quelconque sans le recours à l'acide tranexamique a montré que des complications hémorragiques survenaient dans 11 % des 281 interventions chirurgicales (IC à 95 %, 6 à 19 %)[95,96,98,100-102]. Les professionnels de santé ont jugé que l'hémostase était appropriée dans 98 % des procédures (IC à 95 %, 91 à 99 %)[97,99,102], et la proportion de participants ayant besoin d'un remplacement de facteur en postopératoire était de 54 % (7 sur 13)[101]. Aucun événement thrombotique n'a été rapporté dans les trois études ayant servi à l'évaluation de ce critère[95,97,102]. Environ 2 % des patients ont développé des inhibiteurs de facteur (IC à 95 %, 0 à 21 %)[98,99]. Quatre études faisant état d'événements indésirables n'ont rapporté aucune réaction allergique, aucune infection de plaie, ni aucun autre événement indésirable, sauf chez un patient présentant un épisode vasovagal ayant nécessité une hospitalisation pour observation[95,99,100,102].

Pour l'acide tranexamique seul, l'analyse poolée a montré des saignements dans 14 % des interventions (IC à 95 %, 9 à 20 %), avec un séjour hospitalier moyen de quatre jours[103-106].

Dans l'ensemble, la certitude de ces effets estimés est très faible en raison du risque de biais, des comparaisons indirectes dans les études et de l'imprécision des estimations (profil de preuve fourni dans l'appendice 5).

Autres critères EtD et aspects à prendre en considération.

La table ronde a reflété la variabilité dans la façon dont les patients et les cliniciens perçoivent le compromis entre les effets indésirables potentiels et les bénéfices. Les patients du panel des lignes directrices ont accordé une grande importance à l'évitement des effets indésirables, tandis que les cliniciens ont accordé une grande importance à l'évitement des complications hémorragiques. Sur la base de la probabilité d'effets souhaitables sur l'hémostase et du potentiel d'effets indésirables, le panel

Il a également discuté de la possibilité d'un effet additif des effets indésirables lorsque deux interventions sont prescrites. Cela a conduit le panel à juger l'augmentation du taux de FW à 0,50 UI/ml avec toute intervention conjointement avec l'acide tranexamique comme étant la plus néfaste. Le panel a néanmoins noté qu'aucune des trois options de traitement n'est susceptible d'entraîner des effets néfastes fréquents et importants.

Bien que l'acide tranexamique ait été le principal anti-fibrinolytique considéré par le panel, nous reconnaissons que l'acide -aminocaproïque est une solution de remplacement raisonnable, en particulier lorsqu'il est utilisé en rinçage oral dans les procédures dentaires ou administré sous forme liquide dans la population pédiatrique.

Conclusions et besoins en recherche pour ces recommandations.

D'après le corpus de données probantes disponible, il est probable que l'acide tranexamique combiné à l'obtention de taux de FW d'au moins 0,50 UI/ml avec la desmopressine ou le concentré de facteur réduise le risque de saignements postopératoires. Il y a très peu de certitude quant à l'effet de cette stratégie sur les saignements majeurs ou les effets indésirables liés au traitement. Cependant, en raison de la faible certitude des preuves ou de l'absence d'informations publiées sur les autres critères, le fait que nous n'ayons pas trouvé de preuves d'un effet sur ces critères n'implique pas qu'un tel effet n'existe pas.

L recommandation

Les données probantes suggèrent que l'obtention de taux de FW d'au moins 0,50 UI/ml par un traitement quelconque conjointement avec l'acide tranexamique fournirait les effets les plus souhaitables en ce qui concerne l'hémostase. Étant donné l'équilibre similaire des effets, la recommandation d'augmenter les taux de FW à > 0,50 UI/ml avec la desmopressine ou le concentré de facteur par l'ajout d'acide tranexamique plutôt que d'augmenter les taux de FW à > 0,50 UI/ml avec la desmopressine seule ou le concentré de facteur seul accorde une grande importance aux effets synergiques de l'association du concentré de FW et de l'acide tranexamique, compte tenu des différents mécanismes d'action ainsi que du profil d'effets indésirables minimal de l'acide tranex

Gynécologie : saignements menstruels abondants

Chez les femmes atteintes de la mW avec saignements menstruels abondants, faudrait-il prescrire l'acide tranexamique, l'hormonothérapie (système intra-utérin à libération de lévonorgestrel ou contraceptifs hormonaux) ou la desmopressine?

RECOMMANDATION 6A

Le panel *suggère* d'utiliser soit une hormonothérapie (CHC ou système intra-utérin à libération de lévonorgestrel) soit de l'acide tranexamique plutôt que de la desmopressine pour traiter les femmes atteintes de la mW dont les saignements menstruels sont abondants et qui ne souhaitent pas avoir d'enfants (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves des effets).

RECOMMANDATION 6B

Le panel *suggère* d'utiliser de l'acide tranexamique plutôt que de la desmopressine pour traiter les femmes atteintes de la mW dont les saignements menstruels sont abondants et qui souhaitent avoir des enfants (recommandation conditionnelle reposant sur une très faible certitude des preuves).

Remarques :

- L2tôdeu7ae ants mensbeBTn BT/Tn amiquemes suppS)/MCmes (enfants irysvi[(enfa9ts (r129 5sympti

Les femmes ayant des troubles de la coagulation connus et des saignements menstruels abondants doivent faire l'objet d'une évaluation gynécologique standard recommandée pour les femmes ayant des saignements menstruels abondants dans la population générale afin d'écarter des pathologies pelviennes courantes telles que fibroïdes et polypes, en particulier chez celles ne répondant pas au traitement de première intention.

Il faut prévoir une prise en considération spéciale des effets indésirables du traitement pour celles qui sont à risque élevé d'hyperplasie/de tumeurs endométriales, notamment les femmes âgées de plus de 35 ans et celles présentant des ovaires polykystiques, un indice de masse corporelle élevé et des comorbidités telles que diabète et hypertension.

Synthèse des preuves.

Nous avons trouvé deux études comparatives : un essai clinique randomisé comparant l'acide tranexamique à la desmopressine[107] et une étude observationnelle comparant l'hormonothérapie à la desmopressine[74]. En outre, nous avons trouvé cinq séries de cas concernant un système intra-utérin à libération de lévonorgestrel[108-112]. Nous avons également interrogé les membres du panel pour recueillir des données sur leur expérience. Le cadre EtD pour cette recommandation est disponible en ligne au https://guidelines.ash.gradepro.org/profile/2xCXJKkZZBI. Cette discussion porte sur le traitement de première intention des saignements menstruels abondants.

Bénéfices, effets néfastes et contraintes.

Il n'y avait pas de données comparatives pour évaluer l'acide tranexamique par rapport à l'hormonothérapie. Une comparaison de l'acide tranexamique et de la desmopressine a montré que la différence moyenne des pertes sanguines menstruelles mesurée par PBAC était de 41,6 points plus élevée avec la desmopressine qu'avec l'acide tranexamique (19,6 *vs* 63,6)[107]. La qualité de vie, telle qu'elle a été évaluée au moyen de plusieurs instruments, n'a pas été explicitement comparée entre les groupes. Bien que les scores du domaine de la qualité de vie et des instruments aient augmenté avec les deux interventions, cela n'était pas statistiquement significatif. Il n'était pas possible d'estimer les effets indésirables comparatifs entre l'acide tranexamique et la desmopressine.

Il n'y avait pas de différence entre la desmopressine et l'hormonothérapie telles qu'elles ont été évaluées d'après le soulagement des symptômes (RR, 0,90; IC à 95 %, 0,66 à 1,23)[74]. Le flux menstruel évalué par PBAC était de 0,9 point plus élevé dans le groupe desmopressine que dans le groupe hormonothérapie (IC à 95 %, 9,89 inférieur à 11,69 supérieur). Aucun effet indésirable n'a été rapporté.

Des données non comparatives concernant un système intra-utérin à libération de lévonorgestrel ont fait état du contrôle des saignements menstruels abondants tels qu'ils ont été évalués par le score PBAC, de l'amélioration de la qualité de vie liée à la santé, de l'amélioration des valeurs d'hémoglobine et de la réduction de la durée des menstruations[110,111]. Le taux d'expulsion pour un système intra-utérin à libération de lévonorgestrel était de 15 % et le taux de mauvais positionnement de 10 %.

Dans l'ensemble, la certitude de ces effets estimés est très faible en raison du risque de biais, des comparaisons indirectes dans les études et de l'imprécision des estimations (profil de preuve fourni dans l'appendice 5).

Pour plus d'informations sur les lignes directrices de l'ASH, de l'ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

- Les taux d'activité du FW doivent être maintenus à > 0,50 UI/ml tant que l'épidurale est en place et pendant au moins six heures après son retrait.

- L'évaluation de la pertinence de l'anesthésie neuraxiale pour une patiente en particulier est une décision complexe qui inclut des facteurs en dehors du périmètre de ces lignes directrices. La décision ultime de savoir si ces procédures sont appropriées pour une patiente incombe à l'anesthésiste obstétrical ou au clinicien effectuant la procédure. Les décisions concernant l'anesthésie et l'accouchement doivent être prises dans le contexte d'une discussion multidisciplinaire avec contributions des services d'anesthésie, d'hématologie et d'obstétrique et d'une décision partagée avec la patiente. Ces discussions devraient avoir lieu bien avant la date d'accouchement.

- Le risque thrombotique post-accouchement devrait également être évalué et une prophylaxie prévue si nécessaire (par exemple, bas de contention ou héparine de faible poids moléculaire).

Synthèse des preuves.

Nous n'avons trouvé aucune étude comparative traitant de cette question. Nous avons inclus des éléments de preuve provenant de cinq séries de cas[113-117]. En outre, nous avons systématiquement recueilli l'expérience des membres du panel face à ce scénario clinique. Le cadre EtD pour cette recommandation est disponible en ligne au https://guidelines.ash.gradepro.org/profile/YAaXuhNm_Ac.

Toutes les études ont rapporté l'effet de l'anesthésie neuraxiale sur le développement de complications, y compris hypotension, ponction durale, analgésie inadéquate, ponction sanguine, échec de l'anesthésie. Aucune étude n'a rapporté de risque de saignements majeurs, d'événements indésirables, d'hématome rachidien, de thrombose ou de mortalité.

Bénéfices, effets néfastes et contraintes.

La proportion poolée de complications à la suite d'une procédure épidurale était de 6 % (5 accouchements sur 83). Dans quatre études, les types de complications n'ont pas été indiqués. Dans

Pour plus d'informations sur les lignes directrices de l'ASH, de l'ISTH, de la NHF, et de la FMH pour la maladie Willebrand, veuillez visiter **https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines.**

Conclusions et besoins en recherche pour cette recommandation.

Le panel des lignes directrices a déterminé une très faible certitude des preuves quant au bénéfice net pour la santé du recours à l'acide tranexamique. D'après le corpus de données probantes disponible, il est probable que l'acide tranexamique réduise le risque d'hémorragie post-partum secondaire et peut-être aussi d'hémorragie post-partum primaire, d'hémorragie post-partum primaire sévère et d'hématome vaginal, ainsi que le risque de transfusion sanguine. Il y a très peu de certitude quant à l'effet de l'acide tranexamique sur d'autres critères. Cependant, en raison de la faible certitude des preuves ou de l'absence d'informations publiées sur les autres critères, le fait que nous n'ayons pas trouvé de preuves d'un effet sur ces critères n'implique pas qu'un tel effet n'existe pas.

La recommandation concernant le recours à l'acide tranexamique chez les femmes atteintes de la mW pendant la période post-partum accorde une grande importance aux bénéfices de la prévention et du traitement pendant les hémorragies potentiellement mortelles significatives et les effets néfastes mineurs de l'intervention. L'intervention est peu coûteuse, acceptable pour les principaux acteurs et réalisable.

Le panel a délibéré sur la question de savoir si cette recommandation devait être une recommandation forte, étant donné la possibilité de prévenir des saignements potentiellement mortels dans le contexte d'un risque très minime. Toutefois, une majorité n'a pas pu se dégager sur une recommandation forte en raison de l'absence de données probantes irréfutables.

Comme indiqué dans la section « Obstétrique : anesthésie neuraxiale », le taux d'activité du FW idéal pour prévenir les hémorragies post-partum n'est pas connu, mais il est important de noter que les femmes qui n'ont pas de mW atteignent souvent des taux d'activité du FW > 1,50 UI/ml au moment de l'accouchement, ce qui soulève la question de savoir si les femmes atteintes de la mW sont plus à risque d'hémorragie post-partum si elles n'atteignent pas ces mêmes taux physiologiques.

Le panel a identifié les besoins en recherche complémentaires suivants : 1) recherche sur l'efficacité de l'acide tranexamique dans la prévention et le traitement des HPP chez les femmes atteintes de la mW,

les interventions chirurgicales mineures, telles que soins bucco-dentaires avec bloc dentaire inférieur. Des taux de FVIII ≥ 0,50 UI/ml ont été recommandés pour la période postopératoire et des taux d'activité du FW ≥ 0,50 UI/ml dans le cadre périopératoire. La discussion dans les lignes directrices britanniques met en évidence des preuves pour six jours et pour sept à dix jours, mais ne commente finalement pas le nombre spécifique de jours requis. Cela peut varier selon le type de chirurgie et nécessite de porter une attention particulière aux antécédents chirurgicaux et hémorragiques de chaque patient.

Les lignes directrices de 2008 du National Heart, Lung, and Blood Institute aux États-Unis recommandaient également des tests à la desmopressine, la prise en charge hormonale des menstruations abondantes et des taux de FW > 0,50 UI/ml pour l'anesthésie neuraxiale[123]. Les anti-fibrinolytiques associés à la desmopressine étaient recommandés pour les interventions bucco-dentaires. Après une intervention chirurgicale majeure, il était recommandé de maintenir des taux d'activité du FVIII et du FW > 0,50 UI/ml pendant sept à dix jours.

Nos lignes directrices diffèrent quelque peu des lignes directrices du Royaume-Uni et du National Heart, Lung, and Blood Institute en ce sens que la force des preuves est discutée et, pour de nombreuses recommandations, il est proposé d'inclure les préférences des patients et des familles lorsqu'un choix de traitement clairement optimal fait défaut. Cela permet aux patients et à leurs professionnels de santé de prendre des décisions en fonction des antécédents hémorragiques, des préférences et des valeurs individuelles sur la base des meilleures informations actuellement disponibles.

Ces lignes directrices se focalisent sur les formes héréditaires les plus fréquentes de la mW. Nous aimerions cependant mettre en évidence les lignes directrices récemment publiées sur le diagnostic et la prise en charge de la mW de type plaquettaire du Platelet Physiology Subcommittee de l'ISTH124 et plusieurs revues récentes sur le syndrome de Willebrand acquis[125,126].

Limites de ces lignes directrices

Les limites de ces lignes directrices sont inhérentes à la certitude faible ou très faible des preuves identifiées pour nombre des questions.

Révision ou adaptation des lignes directrices

Prévisions de mise à jour de ces lignes directrices

Après la publication de ces lignes directrices, les organisations collaboratrices les maintiendront à jour grâce à la surveillance de nouvelles données probantes, à une revue continue par les experts et à des révisions régulières fondées sur des recherches dans la littérature.

Mise à jour ou adaptation des recommandations au niveau local

L'adaptation de ces lignes directrices sera nécessaire dans de nombreuses circonstances. Ces adaptations doivent reposer sur les cadres EtD associés[127].

Auteurs

Contribution : N.T.C. et V.H.F. ont rédigé la première ébauche du manuscrit et révisé le manuscrit sur la base des suggestions des auteurs; les membres du panel des lignes directrices R.A.-K., A.A., S.C., J.M.G., P.K., M. Laffan, M. Lavin, F.W.G.L., S.H.O., M.C.O., A.T. et A.C.W. ont relu le manuscrit de façon critique et fourni des suggestions d'amélioration; les membres de l'équipe de synthèse des connaissances R.B.-P., M.A.K., N.H. et R.A.M. ont fourni des résumés des données probantes, relu le manuscrit de façon critique et fourni des suggestions d'amélioration; V.H.F., R.A.M. et N.T.C. ont coprésidé le panel et en ont dirigé les réunions; P.D.J. a présidé le panel simultané des lignes directrices rices R.A.-K., A.A.,

Références :

Institute of Medicine. Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Washington, DC: National Academies Press; 2011.

Qaseem A, Forland F, Macbeth F, Ollenschläger G, Phillips S, van der Wees P; Board of Trustees of the Guidelines International Network. Guidelines International Network: toward international standards for clinical practice guidelines. Ann Intern Med. 2012;156(7):525-531.

Schünemann HJ, Al-Ansary LA, Forland F, et al; Board of Trustees of the Guidelines International Network. Guidelines International Network:

Federici AB, Barillari G, Zanon E, et al. Efficacy and safety of highly purified, doubly virus-inactivated VWF/FVIII concentrates in inherited von Willebrand's disease: results of an Italian cohort study on 120 patients characterized by bleeding severity score. Haemophilia. 2010;16(1):101-110.

Holm E, Abshire TC, Bowen J, et al. Changes in bleeding patterns in von

Amesse LS, Pfaff-Amesse T, Leonardi R, Uddin D, French JA 2nd. Oral contraceptives and DDAVP nasal spray: patterns of use in managing vWD-associated menorrhagia: a single-institution study. J Pediatr Hematol Oncol. 2005;27(7):357-363.

Davidson HC, Stapleton AL, Casselbrant ML, Kitsko DJ. Perioperative incidence and management of hyponatremia in vWD patients undergoing adenotonsillectomy. Laryngoscope. 2011;121(7):1399-1403.

Gorzelnik A, Jablonska-Jesionowska M, Zawadzka-Glos L, Klukowska A. Perioperative management of children with von Willebrand disease and tonsillar hypertrophy in ent department of children hospital in Warsaw Medical University. New Medicine. 2012;2012(4):99-101.

Leissinger C, Becton D, Cornell C Jr, Cox Gill J. High-dose DDAVP intranasal spray (Stimate) for the prevention and treatment of bleeding in patients with mild haemophilia A, mild or moderate type 1 von Willebrand disease and symptomatic carriers of haemophilia A. Haemophilia. 2001;7(3):258-266.

Sharma R, Stein D. Hyponatremia after desmopressin (DDAVP) use in pediatric patients with bleeding disorders undergoing surgeries. J Pediatr Hematol Oncol. 2014;36(6):e371-e375.

Stoof SCM, Cnossen MH, de Maat MPM, Leebeek FWG, Kruip MJHA. Side effects of desmopressin in patients with bleeding disorders. Haemophilia. 2016;22(1):39-45.

Trigg DE, Stergiotou I, Peitsidis P, Kadir RA. A systematic review: The use of desmopressin for treatment and prophylaxis of bleeding disorders in pregnancy. Haemophilia. 2012;18(1):25-33.

Sánchez-Luceros A, Meschengieser SS, Turdó K, et al. Evaluation of the clinical safety of desmopressin during pregnancy in women with a low plasmatic von Willebrand factor level and bleeding history. Thromb Res. 2007;120(3):387-390.

Alesci SR, Krekeler S, Miesbach W. Aspirin or clopidogrel therapy in patients with bleeding disorders (hemophilia and von Willebrand disease). Hamostaseologie. 2010;30(1):A58.

Alesci S, Krekeler S, Seifried E, Miesbach W. Platelet inhibition and bleeding complications in patients with haemophilia/von Willebrand's disease and coronary artery disease. Haemophilia. 2012;18(5):e3